

## Φροντιστήριο 1 – Λύσεις Ασκήσεων

### Άσκηση 1

Να αποδείξετε ότι, για κάθε άρτιο αριθμό  $n$  μεγαλύτερο από 2, υπάρχει 3-κανονικό (κάθε κόμβος έχει βαθμό 3) ακατεύθυντο γράφημα με  $n$  κόμβους.

### Λύση

Έστω  $n$  αυθαίρετος άρτιος αριθμός,  $n \geq 4$ . Αφού ο  $n$  είναι άρτιος, μπορούμε να τον γράψουμε ως  $n = 2k$ . Κατασκευάζουμε γράφημα  $G = (V, E)$  με  $n$  κόμβους ως εξής:

$$V = \{1, 2, 3, \dots, 2k\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), \dots, (2k-1, k), (2k, 1)\} \cup \{(i, k+i) \mid 1 \leq i \leq k\}$$

Στο γράφημα αυτό οι κόμβοι έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά κατά μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου και επιπλέον συνδέθηκαν μέσω «ακτίνων» με τους αντιδιαμετρικούς τους κόμβους. Προφανώς, το γράφημα είναι 3-κανονικό αφού κάθε κόμβος συνδέεται με τον προηγούμενο του κόμβο, τον επόμενο του κόμβο και τον κόμβο που βρίσκεται απέναντί του.

### Άσκηση 2

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός  $\sqrt{2}$  είναι άρρητος.

### Λύση

Ξεκινούμε αποδεικνύοντας το πιο κάτω βοηθητικό λήμμα.

Λήμμα: Για κάθε ζεύγος περιττών ακέραιων  $m$  και  $n$  το γινόμενο  $mn$  είναι περιττό.

Απόδειξη: Αφού οι δύο αριθμοί είναι περιττοί μπορούν να γραφτούν ως  $m = 2a + 1$  και  $n = 2b + 1$ . Άρα

$$m \cdot n = (2a + 1)(2b + 1) = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1$$

Και επομένως το γινόμενο αυτό είναι περιττό.

Επιστρέφουμε στο ζητούμενο της άσκησης. Η απόδειξη θα γίνει με απαγωγή σε άτοπο.

Ας υποθέσουμε για να φτάσουμε σε αντίφαση ότι ο αριθμός  $\sqrt{2}$  είναι ρητός. Τότε, υπάρχουν ακέραιοι  $X$  και  $Y$  τέτοιοι ώστε  $\sqrt{2} = \frac{X}{Y}$ . Έστω  $x$  και  $y$  οι ακέραιοι που προκύπτουν από τους  $X$  και  $Y$  μετά από όλες τις απλοποιήσεις που δυνατόν να είναι εφικτές στον λόγο  $\frac{X}{Y}$ . Προφανώς ισχύει και πάλι ότι  $\sqrt{2} = \frac{x}{y}$  και επιπλέον

$$\sqrt{2} = \frac{x}{y} \Rightarrow 2 = \frac{x^2}{y^2} \Rightarrow 2y^2 = x^2 \quad (*)$$

Επομένως ο αριθμός  $x^2$  είναι άρτιος. Αυτό συνεπάγεται ότι και ο  $x$  είναι άρτιος. (Διότι αν ήταν περιττός τότε, από το Λήμμα πιο πάνω, και ο  $x^2$  θα ήταν περιττός). Κατά συνέπεια,

ο  $x$  μπορεί να γραφτεί ως  $x = 2k$  όπου  $k$  κάποιος ακέραιος. Αντικαθιστώντας στην ισότητα (\*), παίρνουμε

$$2y^2 = x^2 \Rightarrow 2y^2 = 4k^2 \Rightarrow y^2 = 2k^2$$

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο  $y^2$  είναι άρτιος. Όπως και πιο πάνω, ισχύει ότι και ο  $y$  είναι άρτιος.

Άρα οι αριθμοί  $x$  και  $y$  είναι άρτιοι που σημαίνει ότι έχουν κοινό παράγοντα τον αριθμό 2. Αυτό όμως μας οδηγεί σε άτοπο αφού υποθέσαμε ότι οι δύο αριθμοί δεν έχουν κοινούς παράγοντες.

Κατά συνέπεια, η αρχική μας υπόθεση ήταν λανθασμένη και το  $\sqrt{2}$  είναι άρρητος αριθμός. Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη.

### Άσκηση 3

Να αποδείξετε ότι για κάθε ακέραιο  $n \geq 0$ , ο αριθμός  $\phi(n) = 4^{2n+1} + 3^{2n+1}$  είναι πολλαπλάσιο του 7.

#### Λύση

Απόδειξη με επαγωγή στο  $n$ .

*Βασική Περίπτωση:* Για  $n=0$  έχουμε  $\phi(0) = 4^{2 \cdot 0 + 1} + 3^{2 \cdot 0 + 1} = 4 + 3 = 7$ . Επομένως το  $\phi(0)$  είναι πολλαπλάσιο του 7 και το ζητούμενο έπεται.

*Υπόθεση της Επαγωγής:* Υποθέτουμε ότι για τον ακέραιο  $k$  ο αριθμός  $\phi(k) = 4^{2k+1} + 3^{2k+1}$  είναι πολλαπλάσιο του 7. Έστω  $\phi(k) = 4^{2k+1} + 3^{2k+1} = 7a$  για κάποιο ακέραιο  $a$ .

*Βήμα της Επαγωγής:* Θέλουμε να αποδείξουμε ότι ο αριθμός  $\phi(k+1)$  είναι πολλαπλάσιο του 7. Έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \phi(k+1) &= 4^{2(k+1)+1} + 3^{2(k+1)+1} = 4^{2k+3} + 3^{2k+3} = 4^2 \cdot 4^{2k+1} + 3^2 \cdot 3^{2k+1} \\ &= (9+7) \cdot 4^{2k+1} + 9 \cdot 3^{2k+1} = 7 \cdot 4^{2k+1} + 9 \cdot 4^{2k+1} + 9 \cdot 3^{2k+1} \\ &= 7 \cdot 4^{2k+1} + 9(4^{2k+1} + 3^{2k+1}) = 7 \cdot 4^{2k+1} + 9 \cdot \phi(k) \\ &= \{\text{Υπόθεση της Επαγωγής}\} \\ &= 7 \cdot 4^{2k+1} + 9 \cdot 7a \\ &= 7(4^{2k+1} + 9a) \end{aligned}$$

Επομένως ο  $\phi(k+1)$  είναι πολλαπλάσιο του 7.

Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη.

### Άσκηση 4

Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε λέξεις  $x$  και  $y$  ισχύει ότι  $(xy)^R = y^R x^R$ .

#### Λύση

Έστω  $x$  κάποια αυθαίρετη λέξη. Θα αποδείξουμε ότι, για κάθε λέξη  $y$  ισχύει ότι  $(xy)^R = y^R x^R$ . Η απόδειξη θα γίνει με επαγωγή στο μήκος της λέξης  $y$ , έστω  $n$ .

*Βασική Περίπτωση:* Για  $n=0$  έχουμε  $y = \varepsilon$

$$(xy)^R = (x\varepsilon)^R = x^R = \varepsilon^R x^R = y^R x^R$$

και το ζητούμενο έπεται

*Υπόθεση της Επαγωγής:* Υποθέτουμε ότι για οποιαδήποτε λέξη  $y$  με  $|y| < k$ ,

$$(xy)^R = y^R x^R.$$

*Βήμα της Επαγωγής:* Έστω ότι η συμβολοσειρά  $y$  έχει μήκος  $k$ . Τότε μπορούμε να γράψουμε τη  $y$  ως  $y = y'a$ , όπου  $|y'| = k - 1$  και το  $a$  είναι ένα σύμβολο.

Έχουμε ότι

$$(xy)^R = (x y' a)^R$$

= {Υπόθεση της Επαγωγής με πρώτη λέξη την  $x y'$  και δεύτερη λέξη την  $a$   
η οποία προφανώς ικανοποιεί  $|a| < k$ }

$$(a)^R (x y')^R$$

= {Υπόθεση της Επαγωγής με πρώτη λέξη την  $x$  και δεύτερη λέξη την  $y'$   
η οποία προφανώς ικανοποιεί  $|y'| < k$ }

$$(a)^R (y')^R (x)^R$$

= {Υπόθεση της Επαγωγής με πρώτη λέξη την  $y'$  και δεύτερη λέξη την  $a$   
η οποία προφανώς ικανοποιεί  $|a| < k$ }

$$(y' a)^R (x)^R$$

$$= y^R x^R$$

Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη.